

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์ ไม่พ่นยาฆ่าแมลง ฆ่าหญ้าในเขตชุมชน

ของ อบต.บ้านค้อ

การป้องกันอันตรายจากสารเคมีฆ่าหญ้า

ใช้สารอินทรีย์
ทดแทนยาฆ่าหญ้า



ปลูกพืชหมุนเวียน
แล้วไถพรวน



ห้ามใช้ในผักและผลไม้

ไม่ใช้สารเคมีในครัวเรือน
กำจัดมดหรือแมลง



สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ส่งผลกับสุขภาพเราอย่างไร

สารกำจัดวัชพืช

ใช้เพื่อทำลายหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช เช่น พาราควอต ไกลโฟเซต

ผลกระทบต่อสุขภาพ

☹️ หากได้รับในปริมาณความเข้มข้นสูงทันที ทำให้เกิดพิษเฉียบพลัน เกิดแผลในปาก เจ็บคอ กลืนลำบาก อาเจียน ปวดท้อง แสบร้อนในอก ระยะต่อมา ปัสสาวะออกน้อย ไตวาย ตับอักเสบ หายใจหอบเหนื่อย และมีอัตราการเสียชีวิตสูงจากระบบอวัยวะหลายระบบไม่ทำงาน

- ☹️ หากสัมผัสทางผิวหนัง ทำให้ผิวหนังไหม้ แผลพุพอง ปวดแสบ ปวดร้อน เล็บเปลี่ยนสี
- ☹️ ถ้าเข้าตา อาจเกิดแผลที่กระจกตา
- ☹️ หากได้รับปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้งจะเกิดการสะสมพิษในร่างกาย

วิธีปฏิบัติ

อ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้ เพื่อลดอันตรายต่อสุขภาพ
สวมใส่ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีขณะใช้

สวมหน้ากาก

สวมแว่นตา

สวมถุงมือยาง

แหล่งข้อมูล : DDC WATCH จัดทำโรคและภัยสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 พฤศจิกายน 2561 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

